

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής**

**Θέμα: «Ζωοτεχνική Διαχείριση Μονάδας
Αγριόχοιρου στο Νομό Κοζάνης»**

Ματσαρίδης Αναστάσιος

Εισηγητής Καθηγητής: Μητσόπουλος Ιωάννης

Ο αγριόχοιρος στην Ελλάδα



**Απαντάται σε αγέλες σε περιοχές της Θεσσαλίας, Θράκης, Μακεδονίας,
Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας**

ANATOMIA

- Τράχηλος κοντός
- Ραχιαία γραμμή ευθεία
- Κορμός μακρύς-χοντρός παραλληλεπίπεδος
- Λεκάνη-γλουτοί-μηροί ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες
- Σ.Β.: 200 - 300 κιλά
- Ανεπτυγμένοι κυνόδοντες
- Πυραμιδοειδές κεφάλι
- Πλατύ ρύγχος
- Πλατύ κόκαλο στο στόμα



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

- Σκληρό τρίχωμα
- Χονδρές και σκληρές σμήριγγες
- Γκριζόμαυρο και κιτρινωπό χρώμα
- Πυκνή χαίτη που καλύπτει το μέτωπο και το πάνω μέρος του λαιμού
- Σε ένταση η χαίτη αυτή ανασηκώνεται






ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

- Αρσενικά 9-10 μηνών
θηλυκά 8-24 μηνών
- Οίστρος περισσότερες από μια φορά το χρόνο με κύκλο περιόδου 21 ημερών (2 γόνιμες)
- Εποχή αναπαραγωγής:
Χειμώνας (Ιανουάριος)
- Διάρκεια κυοφορίας:
4 μήνες (ελεύθερος)
- 110 ημέρες (εκτροφής)
- Γόνιμος, καλές τοκετομάδες
4-10 χοιριδίων
- Απογαλακτισμός χοιριδίων:
στους τρεις μήνες




Κύκλος Κυοφοριών

Κύκλος Κυοφοριών 1ου Έτους



Κύκλος Κυοφοριών 2ου Έτους



■ Ζευγάρωμα - Κυοφορία

■ Γαλουχία

■ Άνοιστρο

■ Οργασμός



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

- Παμφάγο Θηλαστικό -

Ελεύθερος

- 80% φυτικές
- Βολβούς
- Ρίζες
- Μανιτάρια
- Κάστανα
- Βελανίδια
- 20% ζωικές
- Σκουλήκια
- Τρωκτικά



Εκτροφής

- Ζωοτροφές
(πάσης φύσεως)
- Αίμα
(αφαίμαξης σφαγείων)
- Κρεατάλευρο
- Ωμό κρέας



ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

- Όρος Βέρμιο -

Συνθήκες

- Ελεύθερη εκτροφή
- 2.190 στρέμματα
- Πυκνή βλάστηση
- Φυσικές πηγές
- Ψυχρό κλίμα
- Περιορισμένη επαφή με τον άνθρωπο





- Ζωικό υλικό / Σταβλικές εγκαταστάσεις -

- 300 αγριόχοιροι
 - 120 χοιρομητέρες
 - 4 κάπροι
 - παχυνόμενα
- 3 αγέλες

- Παροχή Ηλεκτρικού
 - Παροχή Νερού
- Περιμετρική Περίφραξη
 - Παρατηρητήρια
 - Σιλό
- Χώρος Σφαγής
- Ψυγεία / Καταψύκτες





ΔΙΑΤΡΟΦΗ

- Κύρια Διατροφή -

Από ελεύθερη βοσκή

- Βελανίδια
- Κάστανα
 - Ρίζες
- Σκαντζόχοιρους
 - Λαγούς
 - Κ.α.

Βιολογικές Ζωοτροφές

- Καλαμπόκι
- Κριθάρι
- Μηδικάλευρο
 - Κ.α.



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

- Τυπικό Σιτηρέσιο Μονάδας-

Σύνθεση σιτηρεσίου ξηράς περιόδου

Συστατικά	Περιεκτικότητα (%)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	33
ΚΡΙΘΑΡΙ	30
ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ	-
ΜΗΔΙΚΑΛΕΥΡΟ	30
ΡΕΓΓΑ	0,8
ΓΑΛΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	1
ΛΑΔΙ	0,5
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ	1
ΡΙΓΑΝΗ	0,3
ΑΛΑΤΙ	0,4
ΙΣΟΡ. 250	3

Σύνθεση σιτηρεσίου θυλάζουσων χοιρομητέρων

Συστατικά	Περιεκτικότητα (%)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	34
ΚΡΙΘΑΡΙ	20
ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ	5
ΜΗΔΙΚΑΛΕΥΡΟ	29,5
ΡΕΓΓΑ	2,4
ΓΑΛΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	2,4
ΛΑΔΙ	1
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ	1,4
ΡΙΓΑΝΗ	0,3
ΑΛΑΤΙ	1
ΙΣΟΡ. 250	3

Σύνθεση σιτηρεσίου πάχυνσης

Συστατικά	Περιεκτικότητα (%)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	29,5
ΚΡΙΘΑΡΙ	20
ΜΗΔΙΚΑΛΕΥΡΟ	25
ΠΙΤΥΡΟ	18
ΡΕΓΓΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	0,5
ΓΑΛΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)	1,2
ΛΑΔΙ	0,5
ΡΙΓΑΝΗ	0,3
ΑΛΑΤΙ	0,5
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ	1,5
ΙΣΟΡΡΟΠΙΤΗΣ 240	3

- Εμπορία Ζωικού Κεφαλαίου -

- Σφαγή & Εμπορία Κρέατος
 - Λιανική & Χονδρική Πώληση
- Εμπορία Ζωντανών Αγριόχοιρων
 - Κυνηγετικοί Σύλλογοι
 - Εκτροφεία Αγριόχοιρων





Γενικά συμπεράσματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

- περιοχή με έντονη βλάστηση
- κλίμα ψυχρό και ξηρό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι
- τα ζώα διαθέτουν πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα
- στο ελάχιστο η ανθρώπινη διαχείριση
- η οικονομική απόδοση της εκτροφής είναι ικανοποιητική

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

- 1 κάπρος μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες έως 15 χοιρομητέρων
- οι αγριόχοιροι είναι αναπαραγωγικά όψιμοι
- οι χοιρομητέρες κάνουν μόνο 1 γέννα το χρόνο
- τα ζώα έχουν αργό ρυθμό ανάπτυξης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΙΑΙΟΤΙΚΟ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Αριθμ. 254 ΗΑ Βαρ/19-10